

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/borowka-zurawina-panel-11-testow-p-3736.html>



Borówka & żurawina - panel (11 testów)

Opis produktu

Borówka & żurawina

W przypadku borówki i żurawiny testom na patogeny poddaje się młode symptomatyczne liście. Najlepszym okresem do badań roślin na patogeny (BLMV, BLSV, BLSHV i BSSV) jest początek sezonu (od maja do czerwca) oraz jego koniec (od sierpnia do września). Najlepszym momentem do badania roślin na nepowirusy (TRSV i ToRSV) jest początek sezonu (od maja do czerwca).

Informacje o zbieraniu próbek zostały potwierdzone przez Dr. Roberta Martina z Research Plant Pathologist for USDA-ARS in Corvallis, Oregon.

Test pozwala określić obecność patogenów:

1. Arabis mosaic virus (ArMV)
2. Blueberry leaf mottle virus (BLMoV)
3. Blueberry scorch virus (BLSV)
4. Blueberry shock virus (BLSHV)
5. Blueberry shoestring virus (BSSV)
6. Phytophthora (Phyt)
7. Peach rosette mosaic virus (PRMV)
8. Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)
9. Tobacco ringspot virus (TRSV)
10. Tobacco streak virus (TSV)
11. Tomato ringspot virus (ToRSV)

Dostępne są również inne testy dla borówki i żurawiny:

1. Alfalfa mosaic virus (AMV)
2. Apple mosaic virus (ApMV)
3. Cherry leaf roll virus (CLRV)
4. Cucumber mosaic virus (CMV)
5. Impatiens necrotic spot virus (INSV)
6. Pelargonium zonate spot virus (PZSV)
7. Phytoplasma (Phyto)
8. Potyvirus group test (POTY)
9. Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)
10. Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)
11. Tobacco mosaic virus (TMV)
12. Tomato aspermy virus (TAV)
13. Tomato black ring virus (TBRV)
14. Tomato mosaic virus (ToMV)
15. Tomato spotted wilt virus (TSWV)
16. Xylella fastidiosa (Xf)